

1980

Granito S. Vicent - 80km SE de Curitiba

- 31-11-80 Viagem aérea SP - Campo Grande Curitiba (Cruzeiro)
- 1-12-80 Chegada a Curitiba e visita ao escritório
a do IPT. Viagem com Eleno, Atsushi, Wagner.
- 6-12-80 Em Curitiba encontramos Francisco que

nos levou em seguida de carro para o acampamento provisório do IPT alugado de instalações da Pedreira de granito do Sérgio (japonês) na confluência das estradas ~~de~~ Curitiba-Brasília e ramal sul asfaltado que vai para Aguas Quentes.

No acampamento passamos 4 noites razoavelmente instalados. Havia uma cozinha (neide) sempre as turmas com o chique e alguns peões sendo dos ^{garimpeiros} paraquenses (Zangão e Trineu) ^{um} ~~um~~ caolho ^{biônico} e outro moreninho ^{evadido}, todos jogando bem o tucos à noite (mais o Sérgio japonês)


Temperatura agradável e ~~claras~~ ^o quente de dia e fresca até levemente fria à tarde e noite. Chuvas rápidas frequentes não atrapalharam o serviço e viagens com Kombi e C-10 (esta necessária em caminhos mais piores). Fauna não muito rica mas de diferente vi; miriápolis muito comum, c/2 pares por segmento (12?) cobertos por placas pardas escuras com borda amarelada (como cabeça de barata) chega até a (5 cm). Coruja apunhada há uma ~~securana~~ com aze machucada (hiro?)

Convivência muito agradável com exenats
de Wagner sempre pressionando para extrair in-
formações improváveis, discutindo ou caçoando
(os outros, principalmente os ausentes, são sempre
mús merdas fazendo uma porra de trabalho vagabundo)
e Atsushi muito rebaído, inibido e individualista


Pontos

- 1 - Dique de diábasio ^{porfírio} NE em Curitiba
- 2 - Veio de Ca com pirita muito espessa aurífera
- 3 - Zona de Mn possível em veios dm falha
NW-W a EW. Logo adiante no bar ocorre
 Mn substituído claramente carbonato + mineralização
verde fina. ~~Ass~~ Ocorrência ~~para~~ associada a
prováveis estruturas circulares?
- 4 - Brecha de falha ~~de~~ bloco na beira da estrada
sem Mn mas com goetita

mapa com atsuchi

- 5 Ponto 5 tem granito equigr + grosso.
Omito albrado com chapéu de ferro
E.W. lenticular?
Lado sul mas 10 m de 
gr. alt. Vermelho argiloso
com qz fino espalhado, parece laterito.
Chapéu de ferro com zonas separadas
de calcedônia em boxwork e qz fino,
pouca argila e outras zonas também box
work ou naciças de limonita e goethite fibra
radiada. A N (aparelhado em trinchera)
um pseudo xenólito arenoso (qz + caulim)
(qz arredondado fino) parecia micáceo
arenito xistificado mas parece variar gra-
dualmente para tipo mais grosseiro
mais típico granitos. Por isto por ± 10 m
no vale a N ribeira corre para W cortando bloco
de granito + fesco.

- Possível zona falhada em granito.
- 6 granito das zonas NE e WW espalhado
- 7 granito do Sergio Japros Pedreira de qz
possível adamellitico com faturas a NW de
sulfetos + ^{micáceo} ~~micáceo~~ NE estaria silicificada
- 8 Pedreira abandonada Anacleto Carreiros. Poria
molibdenita na diácl NW que está empeda
especialmente por mica fina verde. A fatura
N da mesma direção NW faturação e encurvamento em
algumas faturas por mn? Espécie de gneissificação?
- 9 Granito c/ alguns aplitos em contacto



- 9- englobando material granítico mais
fundo
- 10- Águas quentes. Porfiro cl máfio afanítico
cl fe de Plag branco e Cr verm. totalmen-
te alterados + O_2 . Há blocos onde os traços
min. é obtida provavel por intensifica-
ção de processos de falha e hidrotermalizados

11, 12, 13, 14 km. - Bom Ser - Blocos de porfiro deves
englobando outros porfiro e manchas
afaníticas escuras. Em 13 e 14 provavel
greisen com hematita limonita. Alteração
hidrotermal fava.

15 Zona falha greisenificada. Alteração nítida
16 Greisens em granito porfiro ou qz porfir
17 Idem esse blocos jogados de andaluzita homfels
Provavel coindon e turmalina a partir de
cordierita (seg Chico)

18, 19 Perdi o caminho!! (suíço) Corrego Cupim
Tipicos diques basalticos $\pm$ EW a NW a V
Com numerosos pequenos xenólitos
e xenocristas graníticos. granito grosseiro
comum. Um bloco de homfels (?) de aspecto
quartzítico

20 Pedreira Escura granito roseo alojado
para cima ^(e alguns) claro por evidentes soluções
se espraiando a partir de finas
faturas perpendiculares por qz e alguns
sulfeto (pirita, pirrotita)
Posição das faturas $\pm$ SW a NW
caindo para S (?). Zonas
miarolíticas c/ turmalina
e albita (?) e sulfetos (pirita)
Pirita fina e grossa (fina posterior)
No lado W de qz branco mostrada fatura c/
pirita e milibolita em placas grandes. com
salbanda mais grosseira (onde a biotita tambem
se acumula. Esta salbanda e pouco quartzosa

- 21 Blocos de turmalinito provavelmente eluvial ou coluvial em cima de xistos Cuiribá
- 22 Granito. macaco levou ucca do Elenco (!)
- 23 Zonas de hematito possivelmente pirometassomático no contato Gp - Cuiribá
- 24 Argila quartzosa maculada com várias fissões circulares de ± 1 m diâmetro. Possivelmente litigante Bt spotted de granito
- 25 - comum que aparece em baixo.

Sugestões do Clervo

- 1) Alterações propilitica, propilitica etc. Que é isso (Rev. sul africana)
- 2) Verificar cristais muito amarelados zona da pedreira Enco

Economic Geology 1978 2 volumes sobre jazidas de Mo.

Alterações enfatizadas em depósitos Mo
Phyllic, propilitic, argilic, sericitic, hematitization, carbonization, feldspathization (em zonas mineralizadas) silicification.

- Tentar unificar nomenclatura de rochas porfírios.

